




Frynsevinge

Latinsk navn: Thysanoptera

Engelsk navn: Thrips

Klasse: Insekter

Orden: Frynsevinger



Der findes ca. 100 arter af **frynsevinger** i Danmark. Frynsevinger kaldes også for trips, gnavpander eller tordenfluer. Kan ses april-september. Frynsevinger er meget almindelige overalt i det åbne land på enge, marker og i haver. Nogle arter kan optræde i meget store sværme på varme, lumre sommerdage til stor gene, da de kravler på huden og hovedbunden og kravler ind i ører, øjne og næsebor.

Kendetegn

Frynsevinger er små, aflange insekter. Kroppen er mørk med to par frynsede, fjeragtige vinger.

Føde

Frynsevinger suger saft af planter med deres korte, kraftige sugesnabel. Frynsevinger kan gøre stor skade på landbrugsafgrøder.

Fakta



Levesteder: Det åbne land
Længde: 1-2 mm
Nogle arter af frynsevinger kan formere sig ukønnet ved jomfrufødsel
Lægger æg på planter
Nymfe: 4-5 stadier

Vidste du det?

Nymfen er lille, bleg og tyndhudet uden vinger. Efter de første stadier tager nymfen ikke længere føde til sig og bliver meget inaktiv. Sådan gennemgår nymfen de sidste stadier, inden forvandlingen til en voksen frynsevinge er fuldført.



Tegn en frynsevinge





Frynsevingens føde



Fortæl om frynsevinge
