



Almindelig kjove

Latinsk navn: *Stercorarius parasiticus*

Engelsk navn: Arctic skua

Klasse: Fugle

Orden: Mågevadefugle

Familie: Kjoer



Almindelig kjove yngler ikke i Danmark, men den ses om efteråret langs de jyske kyster og i Kattegat, når kjoerne er på træk eller er på rov efter mad. Kjoerne yngler nordpå langs Ishavets kyster og i tundraområder. På ynglepladserne ruger hunnerne, mens hannerne sørger for føde og holder andre dyr på afstand.

Kendetegn

Almindelig kjove forekommer både i en lys og en mørk variant. Den mørke er helt brun med en sort isse, mens den lyse er hvid på undersiden og struben. Begge farvevarianter har hvide felter på vingerne samt forlængede halefjer, der danner en karakteristisk spids.

Føde

Almindelig kjove lever af mus, frøer, æg, fugleunger, insekter, bær og fisk.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav

Vingefang: 97-115 cm

Længde: 46 cm

Vægt: 380-600 g

Maks. levealder: 31 år

Kuld størrelse: 2 æg

Antal kuld: 1

Rugetid: 25-28 dage



Ungetid: 25-30 dage

Vidste du det?

Den almindelige kjove kan selv finde føde, men den lever dog først og fremmest af at stjæle mad fra andre havfugle, fx måger og ternere. Almindelig kjove er en særdeles god flyver, hvilket gør kjoerne i stand til at forfølge de andre fugle og frarøve dem deres bytte i luften.





Tegn en almindelig kjove





Almindelig kjoes føde



Fortæl om almindelig kjo
