



# Kernebider


Latinsk navn: *Coccothraustes coccothraustes*

Engelsk navn: **Hawfinch**

Klasse: **Fugle**

Orden: **Spurvefugle**

Familie: **Finker**



**K**ernebider er en almindelig ynglefugl i Danmark. Den kommer ofte på trækk hertil nordfra. Kernebidere holder mest til i høje træer, og derfor ser man dem ikke så ofte om sommeren. Men om vinteren ses de ved foderbrædtet, hvor de gerne spiser solsikkefrø.

## Kendetegn

Kernebideren kendes på sin kraftige kropsbygning og det store hovede med det meget tykke og kraftige næb. Hovedet er lyst brunligt og nakken grå. Bag næbbet og på halsen har den en sort markering.

## Føde

Kernebideren lever det meste af året af frø og kerner fra frugter. Ungerne fodres dog med insekter og larver.

### Fakta

Levesteder: Skoven,  
Det åbne land  
Vingefang: 29-33 cm  
Længde: 18 cm  
Vægt: 48-62 g  
Max levealder: 12 år  
Kuldstørrelse: 3-6 æg  
Antal kuld: 1  
Rugetid: 12-13 dage  
Ungetid: 11-14 dage

### Vidste du det?

Kernebideren kan knuse sten fra både kirsebær og blomster med sit meget kraftige næb. På den måde får kernebideren fat i føde, som de fleste andre fugle ikke har mulighed for at få fat i.