



Kvækerfinke

Latinsk navn: *Fringilla montifringilla*

Engelsk navn: **Brambling**

Klasse: **Fugle**

Orden: **Spurvefugle**

Familie: **Finker**



Kvækerfinkerne yngler meget sjældent i Danmark. De lever om sommeren især i de nordlige egne i Skandinavien. Om efteråret trækker de til Vesteuropa, hvor de overvintrer.

Kendetegn

Kvækerfinken kendes på det orange bryst og den hvide underside. Hannen har helt sort hovede i yngletiden.

Føde

Kvækerfinkerne lever især af frø og frugter, som de finder i skovbunden. Mod nord, hvor de yngler, færdes de mest i birke- og nåleskove, men i Danmark forestrækker de at søge føde i løvskovene.

Fakta



Levesteder: Skoven,
Det åbne land
Vingefang: 25-26 cm
Længde: 15,5 cm
Vægt: 23-29 g
Maks. levealder: 14 år
Kuld størrelse: 5-7 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 13-14 dage
Ungetid: 14 dage

Vidste du det?

Hvis der et år er mange bog i bøgeskovene, kan man opleve store flokke af kvækerfinker, som spiser bog i skovbunden. Kvækerfinkerne gør ophold i Danmark under trækket fra det nordlige Skandinavien til Vesteuropa for at overvintrer.




Tegn en kvækerfinke





Kvækerfinkens føde



Fortæl om kvækerfinke
