



Rødhals

Latinsk navn: **Erithacus**

Engelsk navn: **Robin**

Klasse: **Fugle**

Orden: **Spurvefugle**

Familie: **Drosler**



Rødhals er en af Danmarks mest almindelige ynglefugle, og den træffes overalt. Om efteråret kommer store flokke af rødhalse på træk nordfra gennem Danmark. Rødhalsen overvintrer i Sydeuropa og Afrika, men i milde vintre bliver en del rødhalse i Danmark.

Kendetegn

Rødhals kaldes også rødkælk på grund af sit rustrøde bryst. Rødhals har korte vinger, kort hale og lange, tynde ben.

Føde

Rødhalsen spiser især insekter og smådyr, men den ses også af og til ved foderbrædterne om vinteren, hvor den er en meget tillidsfuld fugl.

Fakta


Levesteder: Skoven, Det åbne land, Sø og vandløb
Vingefang: 20-22 cm
Længde: 14 cm
Vægt: 16-22 g
Maks. levealder: 17 år
Kuldstørrelse: 4-6 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 13-14 dage
Ungetid: 12-15 dage

Vidste du det?

Rødhalsen bruger sit røde bryst, når den skal forsvare sit territorium mod en anden rødhals. Den retter sig op, puster fjerdragten op og viser sit bryst over for den fremmede fugl, som ofte holder sig borte.




Tegn en rødhals





Rødhalsens føde



Fortæl om rødhals
