



# Sandløber


Latinsk navn: *Calidris alba*

Engelsk navn: **Sanderling**

Klasse: **Fugle**

Orden: **Mågevadefugle**

Familie: **Sneppefugle**



**S**andløber er ret almindelig som trækgæst i juli-september og marts-juni ved de fleste danske kyster og sandstrande, dog især ved den jyske vestkyst og i Vadehavet. Sandløbere optræder også i Danmark både vinter og sommer, men de yngler dog ikke i landet. De trækkende sandløbere optræder ofte i store flokke.

## Kendetegn

I yngletiden er sandløberen rødbrun og plettet med hvid underside og gullig ring omkring næbbet. Om vinteren er fuglene helt hvide med plettet, lysegrå overside samt sorte vingefjer. Sandløberen ligner den almindelige ryle, men har et kortere og mere lige, mørkt næb. Desuden har fuglen hvide vingebånd og sorte ben.

### Fakta

Levesteder: Kyst og hav  
 Vingefang: 36-39 cm  
 Længde: 18-21 cm  
 Vægt: 45-85 g  
 Maks. levealder: 18 år  
 Kuld størrelse: 4 æg  
 Antal kuld: 1-2  
 Rugetid: 24-27 dage  
 Ungetid: 23-24 dage

### Føde

Sandløberen lever af forskellige smådyr som insekter, larver, orme, krebsdyr og bløddyr.

### Vidste du det?

Sandløberen har fået sit navn, fordi den finder føde ved at løbe frem og tilbage mellem bølgelagene i strandkanten. Her æder den, hvad bølgerne lader blive tilbage, og den opsamlers det ved at stikke sit let åbne næb ned i sandet. Fuglen kan dog også finde føde længere oppe på stranden.