



Sortand

Latinsk navn: **Melanitta nigra**
 Engelsk navn: **Common Scoter**
 Klasse: **Fugle**
 Orden: **Andefugle**
 Familie: **Svaner, gæs og ænder**



Sortand er en meget almindeligt træk- og vintergæst i september-maj. Omkring en halv million sortænder overvintrer i danske farvande – især i Kattegat og i Vadehavet. Ænderne lever langs kysterne eller ude på havet, hvor der højst er 20 meter dybt. Ænderne foretrækker ofte havområder med lavvandede sandbunker, hvor de dykker efter føde.

Kendetegn

Hannen hos sortanden er sort. Hunnen er mørkebrun med lyse kinder og hals samt mørk kalot og brunt næb. Hannens næb er sort med en tydelig trekantet, gul plet foran en pukkel øverst på næbbet. Sortænder optræder normalt i meget store flokke på over 1.000 fugle.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
 Vingefang: 70-90 cm
 Længde: 44-54 cm
 Vægt (han): 1300-1450 g
 Vægt (hun): 1200-1300 g
 Maks. levealder: 16 år
 Kuld størrelse: 6-8 æg
 Antal kuld: 1
 Rugetid: 30-31 dage
 Ungetid: 45-50 dage
 Ungetid: 57-66 dage

Føde

Sortænder lever især af muslinger, krebsdyr, snegle og orme.

Vidste du det?

I Danmark optræder sortænderne især i store antal om vinteren, men de findes dog også i landet om sommeren, hvor sortænderne bl.a. fælder deres fjer i store flokke i Vadehavet i juni-august. Ænderne yngler dog ikke i Danmark, men længere nordpå i fjelde og tundraområder.