



Sortmejse

Latinsk navn: **Parus ater**

Engelsk navn: **Coal Tit**

Klasse: **Fugle**

Orden: **Spurvefugle**

Familie: **Mejser**



Sortmejse er en meget lille og buttet mejse. Den er en meget almindelig synglefugl i Danmark, hvor den foretrækker at leve i granskovene. De fleste ynglende sortmejser er her hele året, men om vinteren kommer mange sortmejser nordfra til Danmark, hvor de overvintrer.

Kendetegn

Sortmejsen kendes på sin sorte hætte og den hvide nakkeplet samt den grå ryg.

Føde

Sortmejserne færdes på grund af deres meget ringe størrelse på de yderste grene i grantræerne, hvor større fugle ikke kan opholde sig. Om sommeren spiser de insekter og smådyr, og om vinteren er føden mest frø og nødder.

Fakta



Levesteder: Skoven,
Det åbne land
Vingefang: 17-21 cm
Længde: 11,5 cm
Vægt: 8-10 g
Maks. levealder: 9 år
Kuld størrelse: 7-11 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 14 dage
Ungetid: 16-19 dage

Vidste du det?

Sortmejsen samler i løbet af efteråret nødder, frø og smådyr som vinterforråd. Den maser insekterne og sætter dem fast i en revne i en gren eller bag et stykke løst bark.



Tegn en sortmejsse





Sortmejsens føde



Fortæl om sortmejs
