



# Latterfrø

Latinsk navn: *Rana ridibunda*  
 Engelsk navn: Marsh Frog  
 Klasse: Padder og krybdyr  
 Orden: Springpadder  
 Familie: Egentlige frøer



**L**atterfrøen lever i store vandhuller, vandløb og søer med meget plantevækst, så frøen kan ligge skjult i vandoverfladen. Frøen forekommer også i grus- og lergrave. Latterfrøen findes i Danmark kun naturligt på Bornholm.

## Kendetegn


Latterfrøen er en vortet frø. Den er mørkebrun og grøn med mørke pletter. Bugen er hvid med mørke aftegninger. Fra hvert øje løber en brunlig hudfold ned ad ryggen. Øjnene sidder tæt ovenpå hovedet. Hannen har oppustelige kvækkeposer – en ved hver mundvig.

## Føde

Latterfrøerne æder insekter, salamandere, småfisk, småfugle og andre frøer.

### Fakta

Levesteder: Sø og vandløb  
 Længde (hun): op til 13 cm  
 Længe (han): 5-10 cm  
 Antal æg: op til 16.000 æg  
 Klækningstid: 5-8 dage  
 Tid som haletudse: ?  
 Længde (haletudse): ?  
 Dvale: november-marts



### Vidste du det?

Latterfrøen minder på flere punkter om grøn frø. Grøn frø er dog mere grøn og mindre vortet. Latterfrøen lever i større vandhuller og søer modsat den grønne frø, som lever i mindre søer og vandhuller. Den grønne frø kan desuden overvintre både på land og i vand, hvorimod latterfrøen altid overvintret i vand.